



**DIRECTION DE LA CLIMATOLOGIE ET DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES**



BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRES

Mois : JANVIER

Décade : 03

Année : 2026

SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE

I- SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE

La troisième décade du mois de janvier 2026 s'est caractérisée par des conditions globalement sèches sur l'ensemble du territoire national. Aucune quantité d'eau n'est recueillie sur le réseau d'observation pluviométrique.

Comparativement à la normale climatique 1991-2020, les précipitations de la décade, ainsi que les cumuls enregistrés depuis le début de l'année et depuis le démarrage de la saison pluvieuse, demeurent globalement déficitaires. En conséquence, le bilan hydrique de la décade est négatif sur l'ensemble du pays.

II- APERÇU CLIMATOLOGIQUE

Au cours de la troisième décade du mois de janvier 2026, le réseau synoptique n'a enregistré aucune hauteur de pluie.


Comparativement aux normales climatiques, les cumuls pluviométriques décadiques sont déficitaires sur l'ensemble du réseau synoptique. Depuis le début de l'année civile, les cumuls pluviométriques affichent des écarts négatifs sur l'ensemble des stations synoptiques du pays. Sur la station synoptique de Cotonou, ces cumuls pluviométriques sont tous positifs. (Voir Tableaux I, II-a et II-b)

La situation hygrothermique de la décade est caractérisée par :

- une augmentation de la température moyenne sous abri par rapport à la normale sur l'ensemble du réseau synoptique. Sur les stations synoptiques de Natitingou et Kandi, elle est particulièrement à la baisse ;
- une baisse de l'humidité relative moyenne par rapport à la normale sur l'ensemble du réseau synoptique. Sur la station synoptique de Bohicon, elle est particulièrement à la hausse ;
- une durée moyenne journalière d'insolation d'environ 8 heures ;
- des déficits moyens de saturation en vapeur d'eau compris entre 9,7 hPa à Cotonou et 25,7 hPa à Kandi ;
- une évapotranspiration potentielle (ETP) journalière moyenne de 4,2 mm.

III- SUIVI DE VEGETATION

Au cours de la deuxième décennie du mois de janvier 2026, la végétation est dense sur l'ensemble des régions au Sud et au Centre du pays. Sur les régions situées au Nord, elle est modérée. Comparativement à la moyenne 2012-2021, la couverture végétale s'est nettement améliorée au Sud et au Centre du pays (anomalie positive). Elle ne s'est pas améliorée sur l'ensemble des régions au Nord du pays (anomalie négative). Au nord, particulièrement dans le département de l'Alibori, elle s'est légèrement améliorée au cours de la décennie.



									ANNEE:	2026
									MOIS:	JAN
									DECADE	III

RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION
(Tableau I)

I. DONNEES CLIMATIQUES (Moyennes sur décade)

STATIONS	TEMPERATURE en °/10					HYGROMETRIE				
	Sous Abri			Mini au Sol		Humidité			Vapeur d'eau (hpa)	
	Min.	Max.	Moy.	"+10cm	"+50cm	Mini.	Max.	Moy.	Tension de Vapeur	Déficit
COTONOU	25,4	31,9	28,6	25,1	#DIV/0!	60	94	74	31,3	9,7
<i>Ecart/Normale</i>	0,5	0,2	0,3			-1	1	0		
BOHICON	23,6	36,0	29,8	22,4	21,9	32	98	58	26,0	16,7
<i>Ecart/Normale</i>	0,1	0,5	0,3			-5	8	1		
SAVE	22,2	37,6	29,9	21,1	20,7	19	79	43	17,2	26,2
<i>Ecart/Normale</i>	-0,3	1,1	0,4			-8	1	-5		
PARAKOU	22,5	35,3	28,9	22,2	19,4	13	35	22	8,0	32,5
<i>Ecart/Normale</i>	1,7	-0,5	0,6			-3	-18	-11		
NATITINGOU	16,5	34,9	25,7	14,9	14,9	12	44	25	8,3	26,1
<i>Ecart/Normale</i>	-2,6	-0,7	-1,7			-8	-1	-7		
KANDI	18,3	34,0	26,2	11,9	15,6	8	30	17	11,4	25,7
<i>Ecart/Normale</i>	0,4	-0,9	-0,3			-5	-13	-9		

NOTA BENE :

* L'humidité moyenne (Umoy) est calculée à partir de la température moyenne. Elle est différente de la demi-
somme des valeurs Umax et Umin.

* Déficit de saturation = Tension de vapeur max. quot. - Tension de vapeur moyenne

* Les données manquantes sont codées par "-

ANNEE :	2026	MOIS :	JAN	DECADE :	III
---------	------	--------	-----	----------	-----

RESEAU PRINCIPAL D'OBSERVATION (suite)

(Tableau II-a /II-b)

II-a / DONNEES CLIMATIQUES COMPLEMENTAIRES (Moyennes, Extrêmes, Cumul)

STATIONS	ENSOLEILLEMENT			VENT 10m en m/s		EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYDRIQUE POTENTIEL		
	Valeus moyennes			vent moyen	vent maxi.	EVAPO. Bac	ETP Penman	Bilan hydrique potentiel
	Durée Insolation h./10	Fraction Insolation %	Rayonn. Global j/cm2					
COTONOU	4,7	43,8	1871,8	3,0	5,1	52,7	42,1	-42,1
BOHICON	7,8	72,5	2348,3	2,2	3,6	51,0	47,3	-47,3
SAVE	8,2	76,8	2419,5	1,6	2,7	72,4	46,3	-46,3
PARAKOU	9,1	85,7	2510,5	3,2	5,5	107,3	45,1	-45,1
NATITINGOU	9,7	92,0	2621,7	2,3	5,2	84,7	39,3	-39,3
KANDI	9,0	84,9	2496,1	2,0	#DIV/0!	186,4	43,1	-43,1

II-b / DONNEES PLUVIOMETRIQUES (Cumul et Ecart)

STATIONS	REPARTITION		C U M U L O B S E R V E (mm et /10)						
	Nbre jours de pluie supérieur à:		Sur la décade en cours	Ecart à la normale	Depuis début année civile	Ecart à la normale	Depuis début Saison des pluies	Ecart à la normale	
	00 mm	20 mm							
COTONOU	0	0	0,0	-3,9	97,4	78,0	"	"	
BOHICON	0	0	0,0	-1,3	0,0	-7,9	"	"	
SAVE	0	0	0,0	-3,1	0,0	-8,1	"	"	
PARAKOU	0	0	0,0	-1,2	0,0	-4,9	"	"	
NATITINGOU	0	0	0,0	-0,2	0,0	-1,8	"	"	
KANDI	0	0	0,0	0,0	0,0	-0,3	"	"	

*** NOTA BENE ***

La saison des pluies s'étale du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE au nord de TCHAOUROU
Au sud de TCHAOUROU, on note deux saisons pluvieuses:

* La 1ère du 01 MARS au 31 JUILLET et

* La 2ème du 01 SEPTEMBRE au 31 NOVEMBRE

Les données manquantes ou non calculées sont codées par "-

GLOSSAIRE

Anticyclone

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de haute pression.

Bilan hydrique

Comparaison entre les apports et les pertes en eau dans un lieu et pour une période.

Dépression

Zone de circulation atmosphérique autour d'un centre de basse pression.

Dorsale

Terme généralement employé pour désigner une crête barométrique se déplaçant rapidement entre deux dépressions ou creux.

Évapotranspiration Potentielle (ETP)

Quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat donné par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. Elle comprend donc l'évaporation au niveau du sol et la transpiration de la végétation d'une région donnée pendant le temps considéré (Source FAO).

Front Intertropical

Front quasi permanent séparant les alizés boréal et austral ou constituant la limite extrême d'une mousson tropicale.

Perturbation pluvio-orageuse

Perturbation associée à des amas nuageux à fortes extensions verticales (Cumulonimbus) se déplaçant parfois sur de grandes distances, accompagnés assez souvent de vents forts, de pluie et d'orage.

Thalweg

(Creux barométrique) Région allongée dans laquelle la pression atmosphérique est relativement basse.